



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍ LIST – Tropický deštný les

1. Do mapky zakresli lokalizaci největších tropických deštných lesů na Zemi.

World Mercator Projection Map with Country Outlines



This is a royalty free image that can be used for your personal, corporate or education projects. It can not be resold or freely distributed, if you need an editable PowerPoint or Adobe Illustrator version of this map please visit www.bjdesign.com or www.mapsfordesign.com. This text can be cropped off. © Copyright Bruce Jones Design Inc. 2009

1)

2. Převážnou většinu tropických deštných lesů (TDL) najdeme okolo, kde se rozprostírá dle Köppenovy klasifikace podnebí tzv. podnebný pás. Průměrné denní teploty se zde pohybují mezi °C až °C, teploty jsou zde výrazně nižší než v tropickém suchém pásu, hlavní příčinou toho je:
.....
.....
.....
3. Z hlediska úhrnu srážek spadne za rok průměrně až mm, maximální úhrny však mohou být však až Největší úhrny srážek najdeme například na pobřeží zálivu – Kamerunské město Debunja, blízko významné



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- sopky – Kamerunské hory, popřípadě na severu Indie v oblasti Čerapundží (Cherarapungi). Velmi deštivou oblastí jsou i jedny ostrovy, které leží na tzv. horké skvrně, jde o ostrovy, se správním střediskem - městem Honolulu.
4. Pro TDL je typická velká biodiverzita neboli
 5. Z hlediska vegetace se zde vyskytuje několik, od mechového až po stromové. Na malé ploše zde může růst obrovský počet různých druhů rostlin, člověk zde těží například vzácné dřeviny (uveď alespoň 2).
 6. Z živočichů má největší zastoupení nejpočetnější třída živočichů, kterých tady žije více než různých druhů. Početná je i třída, zastoupená dravými amazonskými, které svými ostrými zuby dokáží v hejnu během několika minut roztrhat i savce velikosti krávy. Na stromech je hojně zastoupena třída, např. tzv. psohlavci, dále zde žije hodně....., živících se semeny a plody stromů. Plodožraví jsou např. s velkými, dutými zobáky, semena, mnohdy i tvrdé ořechy chutnají zase Obojživelníci jsou hojně zastoupení tzv. žábami, z čeledi *Dendrobatidae*, které slouží Indiánům k výrobě smrtících hrotů šípů. Žabky z této čeledi mají typické znaky jedovatých organismů, např:
.....
 7. Typickými půdními typy jsou tzv. ferrity neboli, popřípadě tzv. laterity neboli, půdy mají poměrně mocnou vrstvu, který je zde díky velkému opadu listů a úhynu živočichů. Problém úrodnosti těchto půd však souvisí s tím, že jsou po vykácení rychle půdy minerálně vyčerpané. Velké plochy pralesů byly vykáceny a místo nich vybudovány plantáže na
..... (vyjmenuj alespoň 4 plodiny, které se zde pěstují plantážním způsobem)
 8. Těží se zde například nejvýznamnější ruda hliníku, a to:, jedním z největších producentů je ostrov, s hlavním městem Kingston.

Použité zdroje:

- 1) World Mercator Projection Map with Country Outlines, Royalty free image, Copyright Bruce Jones Design Inc.2009,
http://www.freeusandworldmaps.com/html/World_Projections/WorldPrint.html